

**Corso per aspiranti
g.e.v. e o.f.v.
Parco dell'Adamello
2013
Riconoscimento
Specie animali**

Foto: Masimo Ragusa

I galliformi si differenziano in

Tetraonidi , con narici e zampe ricoperte da piumino, vivono a quote più alte .

- **FRANCOLINO DI MONTE**
- **GALLO CEDRONE**
- **GALLO FORCELLO**
- **PERNICE BIANCA**

Fasianidi, con narici e zampe nude.

- **COTURNICE**

FRANCOLINO DI MONTE
(Bonasa bonasia)

Peso: 370-450 g.

Ha ali corte e arrotondate, coda quasi rotonda.

I giovani già in settembre assumono una livrea molto simile agli adulti

Habitat: 800-1300 m., specie esclusivamente forestale, boschi misti, alcune componenti vegetazionali sono a lui indispensabili: uno strato arbustivo abbondante e diversificato, dove ricerca il nutrimento, presenza di radure erbose, un buon grado di umidità nel terreno.



Colore: bruno rossastro e grigio bruno con barrature scure più fitte sul dorso, più chiari il petto e l'addome


Dimorfismo sessuale: poco accentuato; caratteristiche distintive del maschio sono una macchia nera sulla gola ed un ciuffo di penne erettili nella zona cervicale. La femmina è leggermente più piccola con colori meno vivaci



GALLO CEDRONE (Tetrao urogallus)

Peso: 5,0-6,0 Kg nel maschio, 2,5-3,0 Kg nella femmina

di dimensioni molto grandi, forme pesanti, becco robusto, breve e arcuato, grigiastro con narici ricoperte di penne; ali corte, larghe e appena arrotondate, tarsi rivestiti di piume di tonalità bruna e dita pettinate. *Habitat*: boschi alpini di conifere preferibilmente misti a faggio e betulla con fitto sottobosco alternato a radure con abbondante presenza di mirtillo, posti a un'altitudine compresa tra i 1000 e i 1800 m.



Dimorfismo sessuale molto accentuato: maschio nerastro con collo blu verde lucente, ciuffo di piume pendente dal manto a forma di barba, ali brune e coda nera con macchie bianche. Macchia bianca sulla spalla, caruncole rosse.

Femmina bruno-mimetica con abbondanti segni bianchi e neri e petto caratteristicamente bruno-ruggine. Si distingue dalla femmina del gallo forcello per le maggiori dimensioni e per la coda arrotondata. Caruncola meno evidente che nel maschio





GALLO FORCELLO (*Tetrao tetrix*)

Peso: 1,100-1,500 g. nel maschio, 0,750-1,100 nelle femmine

Morfologia: dimensioni grandi, becco breve di colore bruno nerastro, narici ricoperte da penne, ali corte e appuntite, coda a forma di lira nel maschio e appena forcuta nella femmina, tarsi rivestiti da piume bruno nerastre e dita fornite di pettini cornei. Habitat: aree montane comprese tra i 1500-2300 m, con foreste di conifere, radure pascolate da bestiame bovino, ricche di specie a foglia caduca e con notevole presenza di rododendro.




Dimorfismo sessuale molto accentuato: piumaggio del **maschio** nero azzurro dai riflessi metallici ad eccezione di bande alari, spalle e sottocoda bianche, ali brune. Copritrici inferiori delle ali bianche. Vistose caruncole rosse sopra gli occhi. **Femmina** di colore bruno scuro vermicolato di nero, barra alare e sottocoda bianchi.





Le parate nuziali iniziano nel mese di aprile e terminano verso la fine di maggio. I maschi si riuniscono in luoghi tradizionali, **le arene**, dove effettuano esibizioni molto spettacolari battendosi tra di loro.



PERNICE BIANCA (*Lagopus mutus*)

Peso: 400-480 g.

Morfologia: dimensioni medie, forme massicce e raccolte, becco forte e robusto bruno d'estate e nero d'inverno, con base ricoperta di penne, ali e coda corte e arrotondate, zampe del tutto rivestite di piume. in inverno il piumaggio è completamente bianco onde garantire una perfetta mimetizzazione, con l'eccezione della coda e delle redini nere che da becco attraversano l'occhio solo nei maschi

Habitat: 2200-3200 m., prateria alpina intervallata a pietraie con vegetazione pioniera, rupi, vallette nivali, morene e, alle quote inferiori, arbusteto alpino.



In estate il maschio ha parti superiori, petto e fianchi bruno grigiastro fittamente vermicolati e le restanti parti più o meno bianche. La femmina mostra tonalità fulve nel piumaggio. In autunno i colori dell'abito estivo diventano pallidi e si estendono le zone bianche, soprattutto a livello del petto. La femmina in questo periodo appare più brunastra



COTURNICE (*Alectoris graeca saxatilis*)

Peso: 600-700 g nel maschio, 550 g nella femmina

Morfologia: dimensioni medie e corporatura massiccia con parti superiori, vertice, dorso, groppone di colore bruno grigio, petto grigio-azzurro, addome cannella, gola bianca contornata da un collare nero nettamente delimitato che parte dalla base del becco. Penne dei fianchi grigio-azzurre alla base, con apici castani preceduti da due fasce nere inframmezzate da una più larga fascia color crema.

Ali corte e arrotondate, timoniere rosso-castano, becco tozzo leggermente arcuato verso il basso di colore rosso corallo come il bordo dell'occhio, gambe e piedi rosso-brunastri.



Colore: bruno rossastro e grigio bruno con barrature scure più fitte sul dorso, più chiari il petto e l'addome

Dimorfismo sessuale: poco accentuato; caratteristiche distintive del maschio sono una macchia nera sulla gola ed un ciuffo di penne erettili nella zona cervicale. La femmina è leggermente più piccola con colori meno vivaci

